

2024.01.01-től új Eü pontok diabetológia, belgyógyászat és kardiológia, gyógyszerekkel:

EÜ100 81.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Homozigóta familiáris hypercholesterinaemia kezelésére

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

| MUNKAHELY: | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--|----------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat | írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia | írhat |

| Termék név | Kiszerezés | Törzskönyvi szám |
|------------|---|------------------|
| REPATHA | 140 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2x előretöltött injekciós tollban | eu/1/15/1016/003 |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E780, E782, E784, E785

EÜ100 82.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Szekunder prevencióként azon felnőtt betegek kezelésére, akik életmódváltás, szívérrendszeri társbetegségek (pl. diabetes, hipertonia) célértékre történő kezelése, továbbá akik kórelőzményében akut koronária szindróma (STEMI, non-STEMI, instabil angina), coronaria revaszkularizáció (coronaria bypass vagy coronaria intervenció), ischaemias stroke, perifériás artériás revaszkularizáció (sebészi, vagy endovaszkuláris), vagy vaszkuláris okból bekövetkezett amputáció szerepel és LDL-C szintje meghaladja az 1,8 mmol/L szintet 3 havi maximálisan tolerált dóziszú sztatín kezelés és 1 havi ezetimibe-kezelés ellenére:

- egy sztatinnal vagy sztatinnal és egyéb lipidszintcsökkentő terápiákkal kombinálva
- bizonyítható sztatín intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatín terápiára visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) vagy sztatín ellenjavallat esetén önmagában vagy egyéb lipidszintcsökkentő terápiákkal kombinálva

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

| MUNKAHELY: | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--|----------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat | írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia | írhat |

| Termék név | Kiszerezés | Törzskönyvi szám |
|------------|--|------------------|
| LEQVIO | 284 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN 1x1,5ml előretöltött fecskendőben | EU/1/20/1494/001 |
| LEQVIO | 284 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN 1x1,5ml előretöltött fecskendőben biztonsági tűvédővel | EU/1/20/1494/002 |
| REPATHA | 140 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN 2x előretöltött injekciós tollban | EU/1/15/1016/003 |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E780, E782, E784, E785

Eü70 33.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: NYHA besorolás szerint II–IV funkcionális osztályú, tünetekkel járó, csökkent ejekciós frakciójú (LVEF<40%) krónikus szívelégtelenségben szenvedő felnőttek kezelésére.

Javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| MUNKAHELY: Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Háziorvos | SZAKKÉPESÍTÉS: Kardiológia | JOGOSULTSÁG: javasolhat és írhat Megkötés nélkül Javaslatra írhat |
|--|--------------------------------------|---|

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

| Termék név | Kiszerezés | Törzskönyvi szám |
|-------------------|---|-------------------------|
| - FORXIGA | 10 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban naptáros | EU/1/12/795/007 |
| - FORXIGA | 10 MG FILMTABLETTA 30x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/12/795/009 |
| - JARDIANCE | 10 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | EU/1/14/930/013 |
| - JARDIANCE | 10 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | EU/1/14/930/014 |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) I5092, I5093, I5094

Eü70 34.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Dokumentált idült vesebetegség kezelésére (eGFR-értéke $\geq 25 - \leq 75$ ml/perc/1,73 m², és albuminuriájuk van (3mg/mmol felett), amennyiben már a beteg angiotenzin konvertáló enzim-inhibitorral (ACEi) vagy angiotenzinreceptor-blokkolóval (ARB) történő kezelésben részesült

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

| | | |
|--|---|--|
| MUNKAHELY: Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Háziorvos | SZAKKÉPESÍTÉS: Nephrológia Belgyógyászat | JOGOSULTSÁG: javasolhat és írhat javasolhat és írhat Megkötés nélkül Javaslatra írhat |
|--|---|--|

| Termék név | Kiszerezés | Törzskönyvi szám |
|-------------------|---|-------------------------|
| - FORXIGA | 10 MG FILMTABLETTA 30x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/12/795/009 |
| - JARDIANCE | 10 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | EU/1/14/930/014 |

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) N18, N19