

verzió:

20171201

Has-Kismedence			
Protokoll	Akut Has - Ileus - kontraszt		
Indikáció	Ileus etiológiája		
Előkészítés	4-6 óra éhezés, bőséges folyadék bevitel		
Kontrasztanyag	A kontrasztanyag mennyiség átlagos testalkatra van megadva. Javasolt testsúly és kontrasztanyag töménységtől függővé tenni az adagolást.		
	per os	kontraindikált	
	per rectum		
	i.v.	késői artériás	Portális
	mennyiség (ml)	100	
	sebesség (ml/s)	2-3	
	Só mennyiség (ml)	30-50	
	késleltetés (s)	+10	artériás után 40
	bolus tracking helye	aorta	
Mérések			
	Fázisok	késői artériás	Portális
	Vizsgálandó terület	Has-kismedence (rekesztől a symphysis aljáig)	
Rekonstrukciók, képanyag			
	Felirat/label	Késői artériás	Portális
	Ablak	Lágyrész	Lágyrész
	Szeletvastagság	2-3 mm	2-3 mm
	Increment		
	Irány	AXI+COR+SAG	AXI+COR+SAG
	Kernel/Filter	Soft	Soft
	Típus	MPR	MPR
Megjegyzés			
Irodalom			