

OENO:	31530
Protokoll (OENO megnevezés):	Háti gerinc, AP felvétel
Indikáció:	A gerinc háti szakaszának ábrázolása.
Blende határok:	Felső széle a vállak fölött 2 h. ujjal, alsó széle utolsó bordaív, oldalsó széle mindkét oldalon a gerinctől 3 h. ujjal.
Anatómiai képletek:	Csigolyatestek, processus spinosusok, processus transversusok csigolya közti rések, kisízületi felszín.
Képméret:	15x40 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	Függőleges a mediánsagittális síkban a sternum közepére.
Beállítás (beteg elhelyezése):	Elhelyezése: a vizsgáló asztalon fekszik, a test mediánsagittális síkja az asztal középvonalában.
Felvételi követelmény:	Minden háti csigolya azonos denzitással ábrázolódjon. A háti csigolyák és a hátsó képletek elfordulás nélkül ábrázolódjanak. Ha túlexponált a felvétel, akkor a felső háti csigolyák nem látszanak, ha alulexponált akkor az alsó háti csigolyák világosak. Scoliosis esetén a felvételt álló helyzetben állványnál készítjük.
Megjegyzés:	Az „anódsarok hatás” miatt helyezzük a beteg fejét a röntgen tubus anód vége (+) felé. Keménysugár technika előnyösebb a test különböző vastagságú területein. Oldaljelzés, gonádvédelem.