

REP	program elnevezése	rehabilitációs ellátás jellege				fekvőbeteg ellátás szintje			
		elsőbbségi	ismételt elsőbbségi	halasztott elsőbbségi	programozható (ismételt)	I.szint (alapsomag)	II. szin (bőv. Csomag)	III. szint (spec. Csomag)	III. szint (kiemelt ell)
rehabilitációs medicina alaptevékenységek, speciális tevékenységek és kiemelt tevékenységek felnőttkorban									
szakmakód: 2200 (1) profil NEU (neurológiai rehabilitációs programok profilja)									
1-1	stroke után kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően		előfordul (<3hó)		X	X	X	
					ismételt	X	X	X	
2-1	Sclerosis multiplex, és egyéb progresszív neurológiai betegség miatt szükséges rehabilitáció	ritkán			jellemzően	X	X	X	
					ismételt	X	X	X	
2-2	Heine-Medin betegség és cerebrais paresis, stb. következtében kialakult felnőttkori funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X	X		
2-3	Periferias neuropathia következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	ritkán			jellemzően	X			
2-4	Parkinson kór esetén szükséges rehabilitáció				jellemzően	X	X		
3-1	Komplex nem traumás kéz (felsővégtag) funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	traum, nem traum után			spec. perioperatív	X		X	
4-4	Neuropathiás és egyéb krónikus nem daganatos fájdalom következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X			
10-1	Táplálás, nyelés és egyéb táplálékfelvételi akadályozottság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően						X	
					ritkán progr.; ismételt			X	
14	Az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeként kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció		előfordul					X	
					ismételt			X	
15	A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése következményeként kialakult fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				ismételt			X	
Szakmakód: 2200 (2) profil REU (Reumatológiai rehabilitációs programok profilja)									
4-1	Osteoporosis és szövődémei következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	törés nélkül			jellemzően	X			
4-3	Izületi és gerinc eredetű fájdalom okozta funkciózavarok / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X			
5-1	Gyulladásos reumatológiai betegségek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	csak közv. aktív szak után				X	X		
					ismételt	X	X		
		minden más esetben			jellemzően	X	X		
5-2	Degeneratív reumatológiai állapotok következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X			
5-3	Immunpatológiai – szisztémás autoimmun betegségek miatt szükséges rehabilitáció	akut történet után						X	
					ismételt		X		
		minden más esetben			jellemzően		X		

REP	program elnevezése	rehabilitációs ellátás jellege				fekvőbeteg ellátás szintje			
		elsőbb-ségi	ismételt elsőbbségi	halasztott elsőbbségi	programozható (ismételt)	I.szint (alapsomag)	II. szin (bőv. Csomag)	III. szint (spec. Csomag)	III. szint (kiemelt ell)
Szakmakód: 2200 (3) profil AMP (Érbeteg-Amputáció utáni rehabilitációs programok)									
6-1	Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság szükséges rehabilitáció				ismételt			X	
6-2	Alsó és felső végtag perifériás verőér betegségek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X	X		
6-3	Diabetikus láb szövődményei következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X	X		
7-1	Traumás amputáció következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően				X	X	X	
			előfordul			X	X	X	
					ismételt	X	X	X	
7-2	Perifériás érbetegség miatti amputációt követően szükséges rehabilitáció	jellemzően				X	X	X	
					ismételt	X	X	X	
7-3	Dysmelia okozta végtaghiány III. rendellenesség következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X	X	X	
Szakmakód: 2200 (4) profil TR (posttraumás rehabilitációs programok profilja)									
3-1	Komplex traumás kéz (felsővégtag) funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	közp. trauma után				X			
4-1	Osteoporosis és szövődményei következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	közp. törés után				X	X		
					ismételt	X			
7-1	Traumás amputáció következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően				X	X	X	
			előfordul			X	X	X	
					ismételt	X	X	X	
8-1	Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően						X	
					ismételt		X	X	
9-1	polytrauma következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően	előfordul					X	
					ismételt			X	
9-1 m	Multitrauma következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően					X		
					ismételt		X		
9-2	Komplikált monotrauma illetve fogyatékos személyt ért balesetek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően				X	X		
			előfordul			X	X		
					ismételt	X	X		
Szakmakód: 2200 (5) profil GA (Gastroenterológiai rehabilitációs profil)									
10-3	Krónikus bélbetegség és malnutrició során kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően				X	X	X	
					ismételt	X	X	X	

REP	program elnevezése	rehabilitációs ellátás jellege				fekvőbeteg ellátás szintje			
		elsőbb-ségi	ismételt elsőbb-ségi	halasztott elsőbb-ségi	programozható (ismételt)	I.szint (alap- csomag)	II. szin (bőv. Csomag)	III. szint (spec. Csomag)	III. szint (kiemelt ell)
Szakmakód: 2206, 2207, 2208 kiemelt rehabilitációs ellátási programok									
szakmakód: 2208									
6-1	Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság szükséges rehabilitáció	jellemzően			ismételt				X
8-1	Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően							X
9-1	polytrauma következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően							X
Szakmakód: 2206									
14	Az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeként kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően		előfordul (<6hó)					X
			előfordul						X
					ismételt				X
Szakmakód: 2207									
15	A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése következményeként kialakult fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően			ismételt				X
									X
bármelyik csoporthoz kapcsolódó REP-ek									

2200 szakmakódhoz kapcsolódó REP-ek

4-2	Daganatos fájdalom és következményes funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	ritkán			jellemzően	X			
8-2	Lymphoedema következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően		X	X	
10-2	Obezitás szövődményes eseteiben kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X	X		
11-1	Krónikus veseelégtelenség / vesetraszplasztáció következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	ritkán			jellemzően	X	X		
2200, 2206, 2207, 2208 szakmakódhoz kapcsolódó REP-ek									
12	Immobilitás, inaktivitás okozta funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció kísérő problémaként	NR			NR	X	X	X	
13	Fertőző betegek számára elkülönítést biztosító rehabilitáció (mellékprogramként)	NR			NR	X	X	X	✖

Magyarázat: vastaggal a legjellemzőbb ellátási forma és szint(ek) minden REP-ben

vastaggal, nagyobb betűmérettel a legjellemzőbb ellátási szintek vannak jelölve