

REP	program elnevezése	rehabilitációs ellátás jellege				fekvőbeteg ellátás szintje			
		elsőbbségi	ismételt elsőbbségi	halasztott elsőbbségi	programozható (ismételt)	I.szint (alacsony)	II. szin (bőv. Csomag)	III. szint (spec. Csomag)	Im re
<b>Szakmakód: 2205: gyermekgyógyászati rehabilitáció</b>									
<b>Szakmakód: 2205 (1) profil VEGY vegyes rehabilitációs tevékenység gyermekkorban</b>									
18-1	Cerebralis paresis következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	ritkán			jellemzően	X	X	X	
					ismételt	X	X	X	
18-2	Meningomyelocele következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	ritkán			jellemzően	X	X		
					ismételt	X	X		
18-4	Veleszületett rendellenességek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	ritkán			jellemzően		X		
18-5	Újszülöttkori plexus brachialis lézió miatt szükséges rehabilitáció	kezdetben jellemzően							
					ismételt				
		ritkán			1 éves kor után jellemzően	X			
2-1	Sclerosis multiplex, és egyéb progresszív neurológiai betegség miatt szükséges rehabilitáció	ritkán			jellemzően	X	X	X	
					ismételt	X	X	X	
3-1	Komplexnem nem traumás kéz (felsővégtag) funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X		X	
10-1	Táplálás, nyelés és egyéb táplálékfelvételi akadályozottság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően						X	
					ritkán progr.; ismételt			X	
10-2	Obезitas szövődésményes eseteiben kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X	X		
10-3	Krónikus bélbetegség és malnutrició során kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően			ismételt	X	X	X	
11-1	Krónikus veseelégtelenség / vesetraszplantáció következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X	X		
14	Az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeiként kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció		előfordul					X	
					ismételt			X	
15	A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése következményeként kialakult fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				ismételt			X	

REP	program elnevezése	rehabilitációs ellátás jellege				fekvőbeteg ellátás szintje			
		elsőbbségi	ismételt elsőbbségi	halasztott elsőbbségi	programozható (ismételt)	I.szint (alacsony)	II. szin (bőv. Csomag)	III. szint (spec. Csomag)	Im re
<b>Szakmakód: 2205 (2) profil MS - musculosceletalis: reumatológiai-ortopédia-traumatológiai jellegű rehabilitáció gyermekkorban</b>									
18-3	Gerinc strukturális elváltozása következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	ritkán			jellemzően		X		
5-1	Gyulladásos reumatológiai betegségek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	csak közv. aktív szak után			ismételt	X	X		
		minden más esetben			jellemzően	X	X		
7-3	Dysmelia okozta végtaghiány ill. rendellenesség következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X	X	X	
8-1	Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően			ismételt		X	X	
9-1multiTR	Multitrauma következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően			ismételt	*	X		
9-2	Komplikált monotrauma illetve fogyatékos személyt ért balesetek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően			ismételt	X	X		
<b>Szakmakód: 2205 (3) profil PU (pulmonológiai rehabilitáció gyermekkorban)</b>									
17-3	Restriktív légzőszavarok következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X	X		
17-4	Cistas Fibrosis következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció				jellemzően	X	X		
<b>Szakmakód: 2209 kiemelt rehabilitációs programok gyermekkorban</b>									
8-1	Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően							X
9-1 polytr	polytrauma következtében kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően							X
14	Az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeiként kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően		előfordul (<6hó)					X
				előfordul				X	
				ismételt			X		
15	A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése következményeként kialakult fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció	jellemzően							X
				ismételt			X		
<b>fenti profilok bármelyikéhez kapcsolódó REP lehet</b>									
13	Fertőző betegek számára elkülönítést biztosító rehabilitáció (mellékprogramként)	NR			NR	X	X	X	*

Magyarázat: vastaggal a legjellemzőbb ellátási forma és szint(ek) minden REP-ben